




Повторное кровотечение у пациента, которого лечат содержащим ASS-медикаментом, после обнажения имплантата в области 046



Покрывание Reso-Pac

Число пациентов с плохой свертываемостью растет, с ним растет и риск повторного кровотечения. Все чаще происходят нежелательные послеоперационные кровотечения, которые можно хорошо контролировать с помощью Reso-Pac (рис. 8 а, б).

Результаты и дискуссия

Благодаря Reso-Pac, спектр повязок для слизистых тканей обогатился еще одним инновативным препаратом. Безупречное применение характеризуется несколькими свойствами, которые являются новыми для такого рода повязок. Прежде всего, в этой связи следует назвать хорошую силу прилипания к тканям ротовой полости. Reso-Pac отличается от препаратов-конкурентов тем, что она растворяется без остатка, и, тем самым, позволяет избежать обременительную и чаще всего затруднительную процедуру удаления.

Далее следует отметить эластичность материала, которая позволяет непрерывное исцеление, не образует острых краев и не приводит к язвам от трения, когда используется в качестве подкладки для протезов. Повторная аппликация создает чистоту, и при необходимости, одновременно обновляет подачу лекарства. Как только Вы подружитесь со свойствами Reso-Pac, Вы не будете больше отказываться от нее во время лечения.

Reso-Pac®, первая и особая паста для защиты ран

Показания, преимущества и применение

К.У. Фритцемайер, проф. дважды д-р, университет Дюссельдорф



Рис. 1

Введение

Хотя ранки в полости рта имеют безупречную способность заживать сами по себе, тем не менее, возникают ситуации, при которых внутриротовая ранка должна быть изолирована от заселенной микробами среды полости рта. Такими ситуациями являются: удаления, операции на губах, закрытия или стабилизации зашитых краев раны, а также лечения язвенных гингивитов и переимплантитов с помощью примеси лекарств.

Другие повязки для защиты ран

Состав других повязок основывается чаще всего на эвгеноле, окиси цинка и/или метилметакрилатах для соединения или укрепления материала.

Повязка такого рода цепляется механически в соответствующей области раны на остатках зубов и их промежуточных пространствах, на волокнах раны или на восстановленных ортопедических конструкциях.

Материал, чаще всего, затвердевает после замешивания сам по себе или при появлении слюны. Недостаток таких хорошо зафиксированных повязок ткани состоит в том, что при удалении, из-за твердости связанного материала, часто возникают значительные трудности, вследствие чего, с одной стороны, пациенту причиняется боль, а с другой стороны, под угрозой оказывается область раны.

Когда мы говорим о повязке для защиты ран Reso-Pac (рис. 1), мы говорим об очень легко обрабатываемом материале. Это гидрофильная, готовая к употреблению защита для ран, которая показывает исключительно хорошие свойства приклеивания к тканям ротовой полости. Повязка в течение всего времени остается эластичной, так что не могут возникнуть язвы от надавливания. Наряду с основным веществом, целлюлозой, Reso-Pac содержит мирру, благодаря чему получает свое дезинфицирующее, вяжущее и кровоостанавливающее действие. Вместе с тем, он хорошо пахнет и приятен на вкус. Аллергические реакции до настоящего времени отмечены не были. Собственно, новым и приятным в использовании Reso-Pac является тот факт, что его не нужно удалять. Материал растворяется сам по себе, в зависимости от нагрузки, в течение одного-трех дней без остатка. При большинстве показаний достаточно однократного применения, которое в любом случае ведет к покрытию фибрином области раны. Если этот промежуток времени для защиты раны слишком мал, повязка обновляется. При использовании в качестве носителя лекарства, это кратковременное повторное нанесение даже желательно для своевременного обновления лекарственного препарата.



Извлечение пасты на увлажненную перчатку



Извлечение пасты с помощью увлажненного шпателя



Извлечение пасты из порционной капли



Процесс смешивания Reso-Pac с медикаментом

Применение

В использовании паста Reso-Pac безупречна для пользователя. Самое важное в применении – это хорошая сила прилипания, ведь если на это не обращать внимания, то аппликация обречена на неудачу.

С помощью ключа для тюбика, желаемое количество пасты Reso-Pac выдавливают на хорошо увлажненную перчатку (рис. 2) или влажный шпатель (рис. 3 а), или с помощью подходящего инструмента извлекают из порционной капли (рис. 3 б).


Reso-Pac не клеится к влажным инструментам и тем самым ее очень легко формировать вне и во рту. При этом получают гладкую, как пластилин поверхность, которой затем также можно придать форму с помощью увлажненной слюной щеки или губы.

Если запланировано использование в качестве носителя лекарства, Reso-Pac смешивается на палитре с соответствующим лекарством, например, дезинфицирующим средством или антибиотиком с помощью шпателя (рис. 4). Свойство прилипания пасты поразительно не только на зубах, костных поверхностях и при реставрации протезов, но также на швах, на деснах и на гладких местах для трансплантатов, если они прежде были высушены воздухом.

Показания для Reso-Pac соответствуют показаниям, которые действительны и для других повязок для ран. Но так как Reso-Pac не нужно удалять, врачи гораздо чаще предпочитают наложить эту повязку, потому что не требуется неприятная процедура удаления.

Индикаторы для применения Reso-Pac:

1. Закрытие ранки, например, после экстракции зуба, после оперативного вмешательства, или у заядлых курильщиков
2. Уход за ранкой в рамках лечения антикоагулянтами, напр., ASS
3. Защита подверженного опасности шва, например, после пластического покрытия MAV
4. Защита маргинального пародонта после гингивэктомии
5. Адаптация десны после лоскутной операции
6. Закрытие ранки после глубокого пародонтального кюретажа
7. С добавлением медикаментов: лечение воспаленных гингивитов и инфекций карманов
8. С добавлением медикаментов: лечение периимплантитов
9. С добавлением медикаментов: лечение десенсибилизации шейки зуба
10. Защита шеек зубов после рефторирования
11. Защита или закрытие мест трансплантатов, например, после забора трансплантационной ткани
12. Временное использование в качестве подкладки для протезов
13. Держатель места после обнажения ретинитных зубов
14. Защита открытых поверхностей после расхождения швов



Рана сразу после экстракции зубов



Рана покрытая Reso-Pac




Шов после резекции верхушки корня 36 зуба

Клинические примеры

Из множества показаний несколько клинических примеров должны пояснить применение Reso-Pac:

О необходимости изоляции ран с помощью Reso-Pac после экстракции зубов можно поспорить. Если очевидно, что гигиена полости рта желает лучшего, то повязка Reso-Pac необходима, также как и заядлым курильщикам (рис. 5 а, б), у которых ранка в первое время после операции (рис. 6 а, б) должна быть лишена влияния смолы, или в случае повышенной склонности к кровотечению.


После обнажения ретинитных зубов, ранку или доступ к ней следует оставить открытой, пометив это место для дальнейшего позиционирования брекетов (рис. 7 а, б). Reso-Pac также великолепно подходит для этого. К моменту челюстно-ортопедического лечения материал растворился без остатка, кровь остановилась.



Защищенный с помощью Reso-Pac шов.



Обнажение зуба 13



Повязка на рану Reso-Pac, выполняющая здесь также функцию держателя места.